



| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Ano | 2013 | PE 403A 2012/2-5 |
| Entidade | CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARRIL | |
| Plan explotación | PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS | |
| Réxime | LIBRE MARISQUEO | |
| Modalidade | MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Especies | Ameixa fina (<i>R.decussatus</i>), ameixa babosa (<i>V.pullastra</i>), ameixa xaponesa (<i>R.philippinarum</i>), ameixa bicuda (<i>V.aurea</i>), berberecho (<i>C.edule</i>), birollo (<i>C. glaucum</i>) (*) |
| Ambito do plan | As Malveiras – As Briñas – O Con (AR – 38) e O Corbeiro |
| Subzonas de explotación | |

| Participantes no plan de explotación | | |
|---|--------------|---------------------------|
| Número de permex/persoas autorizadas | | |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes |
| - | 18 | 36 |
| Ampliación do número de permex | | Si |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes/Habilitacións |
| - | 1 | 2 |

| Calendario de explotación | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|--|
| Días máximos de extracción | 100 días (50 días para cada banco) | | | | | | | | | | | |
| Época y zona probable de extracción: | De xaneiro a decembro | | | | | | | | | | | |
| Modalidade: | dende embarcación | | | | | | | | | | | |
| xan | feb | mar | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setemb | outub | novemb | dec | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

| Topes de captura | | |
|-------------------------|---|--|
| | As Malveiras, As Briñas, O Con (AR-38) | O Corbeiro |
| Especies | Tripulante enrolado e a bordo/día | Tripulante enrolado e a bordo/día |
| Ameixa fina | 2 kg | 2 kg |
| Ameixa babosa | 10 kg | 5 kg |
| Ameixa xaponesa | 2 kg | 7 kg |
| Ameixa bicuda | 2 kg | 2 kg |
| Berberecho | 2 kg | 30 kg |
| Birollo (*) | Determinarase na resolución de apertura | Determinarase na resolución de apertura |

| | |
|--------------------------|--|
| Artes a empregar | Rastro cunha separación mínima das varillas de 18 mm |
| Puntos de control | Zona de produción e lonxa de Carril |
| Puntos de venda | Lonxa de Carril |

| Accións a realizar | Epocas probables | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rexeneración zonas improdutivas (area) | X | X | X | | | | | | | X | X | X |
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| Extracción semente para resembr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa babosa, ameixa xaponesa, ameixa fina, berberecho | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Sementeiras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| Especies: preferentemente ameixa babosa e ameixa xaponesa | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Traslados | | | | | | | | | | | | |
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| Especies: | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rareos | | | | | | | | | | | | |
| Zonas: | | | | | | | | | | | | |
| Especies: | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Limpezas e arados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zonas: principalmente zonas recentemente sementadas | | | | | | | | | | | | |